

Cancer i bukspottkörteln och periampullärt - ingång SVF

1 dag

10 dagar

3 dagar

Remittent

Följande kan föranleda misstanke

- Gulsot eller gallstas
- Palpabel knöl i övre delen av buken
- Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång, särskilt i samband med relativt nydebuterad diabetes och/eller steatorré.

Information till patienten

- Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
- Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon samt att sjukvården i vissa fall ringer från dolt nummer

Remiss

Remiss till filterfunktion märkt SVF/ Cancer bukspottkörtel samma dag.
Om patienten är ikterisk ska man överväga remiss för akut omhändertagande.

Relevanta prover

- Blodstatus
- Elstatus inklusive kreatinin
- Leverstatus
- P-glukos
- PK-INR
- Längd
- Vikt

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande

- Bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för potentiellt malign förändring (inklusive IPMN och vidgad pankreasgång) i pankreas eller periampullärt
- Gallstas ej kopplad till gallstens- eller leversjukdom
- Cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet i pankreas eller periampullärt
- Misstanke om malignitet i pankreas eller periampullärt vid bukoperation

Information till patienten

- Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
- Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
- Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon samt att sjukvården i vissa fall ringer från dolt nummer

Remiss

Remiss för standardiserat vårdförlopp skickas samma dag.

OBS! Journalanteckningar måste vara skrivna samma dag som remissen skickas.

Klinisk kemi

Analys

svar till provbeställaren

Radiologen/
Kirurgen

Filterfunktion

Misstanke ska föranleda diagnostisk undersökning enligt följande:

- Gulsot eller gallstas: akut (inom 24 timmar) **ultraljud** av lever, gallvägar och pankreas
- Palpabel knöl i övre delen av buken: **CT buk**
- Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång: **gastroskopi**
- Något av ovanstående symtom i kombination med nydiagnostiserad diabetes: **CT buk**
- Kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud/gastroskopi: **CT buk**
- Vid stark malignitetsmisstanke kan utredningsprocessen förkortas om en DT pankreas/buk utförs redan i denna situation

Kirurgen

Start av standardiserat vårdförlopp