

# Myelom - ingång SVF

0 - 1 dag

Remittent

## Följande fynd ska föranleda misstanke om myelom, förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring

- Skelettsmärter (ofta rygg eller bröst/org/revben)
- Patologiska frakturer, t.ex. kotkompressionsfrakturer, hotande tvärsnittslesion
- Anemi
- Hyperkalcemi
- Polyneuropati eller rizopathi
- Njursvikt
- Hög SR
- Osteoporos hos män och premenopausala kvinnor
- Återkommande bakteriella luftvägsinfektioner

OBS! Vid symtomgivande hyperkalcemi, akut njursvikt och hotande tvärsnittslesion kontaktas omgående hematologkonsult dagtid och akutmottagningen jourtid.

## Vid misstanke ska följande prover tas:

- Blodstatus (hb, vita med diff, trombocyter)
- Elstatus inklusive albumin, kalcium (eller joniserat Ca) och kreatinin
- S-M-komponent
- tU-Bence Jones protein

Kan beställas som paket SVF Myelomprover.

OBS! Remiss märkes SVF.

## Välgrundad misstanke föreligger vid något av följande, oavsett symtom

- M-komponent IgG eller IgA i serum >15 g/l
- M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek
- Monoklonala lätta kedjor i urinen >500 mg/dygn
- S-FLC kvot (involverad lätt kedja/icke-involverad lätt kedja) > 100 (involverad lätt kedja måste vara > 100 mg/l)
- Histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för plasmacellsmalignitet
- Fynd vid bildiagnostik talande för plasmacellsmalignitet

## Välgrundad misstanke föreligger även vid

- Minst ett av följande provsvar:
    - hypogammaglobulinemi
    - M-komponent i serum eller urin (ej IgM)
    - patologisk S-FLC-kvot
- tillsammans med minst ett av följande symtom förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:
- anemi
  - njursvikt
  - hyperkalcemi
  - skelettengagemang
- Patienter med M-komponent som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke ska utredas enligt

## Information till patienten

- Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
- Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
- Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon samt att sjukvården i vissa fall ringer från dolt nummer

## Remiss

Remiss standardiserat vårdförlopp skickas samma dag.

OBS! Journalanteckningar måste vara skrivna samma dag som remissen skickas.

Analys svar till provbeställaren

Start av standardiserat vårdförlopp

Klinisk kemi

Medicin