

Rekommendationer för användning av antigenest (snabbtest) för covid-19 i verksamheter utanför hälso-och sjukvården till exempel på arbetsplatser eller inom idrottsverksamheter

Screening med antigenester där nära kontakter mellan människor inte kan undvikas *kan* vara en tilläggsåtgärd för att tidigt upptäcka smitta och begränsa utbrott.

Antigenester *kan inte* användas för att sluta följa råd och rekommendationer eller för att låta personer med symptom bryta sin isolering.

Vad gäller för aktörer utanför vård och omsorg som erbjuder screening med antigen testning/snabbtest för covid-19?

- Bedöm om nyttan av antigen test i den aktuella situationen är rimlig i förhållande till kostnaderna. Viktiga faktorer är aktuellt smittläge, andel vaccinerade och verksamhetens känslighet. Den verksamhet som inför antigen test ska själv stå för kostnaden.
- Använd ett antigen test som uppfyller folkhälsomyndighetens krav¹ och som är CE-märkt (eller IVD-märkt med dispens av läkemedelsverket för användning som självtest)². Om de testade ska prova sig själva utan hjälp av sjukvårdspersonal krävs ett test som är anpassat för provtagning i näsa.
- Välj testfrekvens och utförare. Vid regelbunden testning bör helst minst två tester per vecka och individ utföras. Testen bör göras precis innan eller i början av ett arbetspass. All testning ska vara frivillig.
- Antigen test har en lägre känslighet jämfört med PCR-test och ska **inte** användas om personen har symptom som kan tala för covid-19. Vid symptom beställ istället PCR-test via 1177.se.
- Se till att de som ska utföra testen förstår hur de ska göra. Felaktiga resultat på grund av missförstånd är vanliga när man är ovan. Alla som ska utföra testen måste läsa igenom hela instruktionen innan denne påbörjar testen. Instruktionsfilmer kan vara till stor hjälp.
- Ge tydliga instruktioner om vad som ska göras vid positivt eller negativt resultat (se nästa sida).
- Vid flera fall inom en verksamhet ska smittspårning inklusive provtagning göras i samråd med Smittspårningsenheten.

Läs mer på:

- 1) [Vägledning för användning av antigen test vid covid-19 \(folkhälsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-oss/utbildning-och-utveckling/antigen-testning/)
- 2) [Självtester för covid-19 | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency \(lakemedelsverket.se\)](https://lakemedelsverket.se/om-lakemedelsverket/produkter-och-tjanster/sjaltester-och-sjaltest-kit-for-covid-19/)

Till dig med positivt resultat:

- Meddela arbetsledare eller annan överenskommen person.
- Påbörja isolering i hemmet.
- Beställ provtagning för PCR via 1177.se
Det är nödvändigt därför att felaktiga positiva resultat ibland kan förekomma med snabbtest. Ett dokumenterat positivt test i patientjournalen krävs också för att du senare ska kunna visa att du har haft sjukdomen.
- Tag kontakt med vården via smittspårningsenheten för att de ska få kännedom om ditt fall och för att du ska få instruktioner.
Telefon: 0480-81050

Till dig med negativt resultat:

- Tänk på att ett negativt resultat inte helt utesluter att du bär på viruset. Testen upptäcker inte alla fall. I vissa undersökningar får så många som hälften av dem med låga virusnivåer falskt negativa provresultat vid användning av antigen test. Du kan också ha blivit smittad men ännu inte börjat producera virus (inkubationsfas).
- Fortsätt följa råd och rekommendationer.
- Om du har symptom som kan tala för covid-19 måste du **också** beställa provtagning med PCR via 1177.se och stanna hemma i väntan på svar. Detta gäller även om antigen testet är negativt.

Andreas Delphin
Samordnare
Samordning hälso- och sjukvård

Annika Carlsson Wistedt
Överläkare
Klinisk mikrobiologi

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av