

Vaccinerande sjuksköterskor inom Region Kalmar län  
Vaccinerande sjuksköterskor i Kalmar läns kommuner

## Ordination enligt generellt direktiv gällande vaccin mot covid-19

Gäller för \_\_\_\_\_

(Enhetens namn, inkl kommunens sjuksköterskor inom området)

### Vaccin

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

### Dos

0,3 ml som intramuskulär injektion. Minst 3 veckor mellan dos 1 och dos 2. Detta vaccin är inte godkänt för subkutan administrering.

Bereds genom att 1,8 ml natriumklorid spädningsvätska 9 mg/ml sätts till flaskan. Ger minst 6 doser. Se separat beredningsinstruktion.

### Indikation

Vaccination mot covid-19. Vaccination rekommenderas till vuxna och barn 16-17 år, dvs individer födda 2005 och tidigare. Därtill rekommenderas vaccination av barn fyllda 12 år och äldre i särskild riskgrupp. Gravida rekommenderas vaccination fr o m graviditetsvecka 12.

Att administrera läkemedel enligt generellt direktiv innebär att sjuksköterska först gjort en bedömning av patientens behov av läkemedlet, samt beaktat indikation, kontraindikation(er) och observanda.

### Kontraindikationer

- Överkänslighet mot någon av vaccinets beståndsdelar. Vid tidigare äkta anafylaktisk reaktion (oavsett agens) eller annan allvarlig reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel kontaktas enhetens läkare som bedömer nyttan med vaccinationen jämfört med risken.

### Observanda

- Vid högaktiv autoimmun sjukdom eller instabil immunsuppression bör beslut om vaccination endast tas av patientansvarig läkare. Behandlingen kan behöva förskjutas i förhållande till vaccinationen.

- Vaccination ska senareläggas hos individer med akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion. Förekomst av lindrig infektion och/eller lågradig feber utgör inte skäl för att senarelägga vaccination.

### Dokumentation

Dokumentation sker enligt separat rutin. Registrering ska göras inom 24 timmar, och är av stor vikt för rapportering till det nationella vaccinationsregistret.

### Patienter med blodförtunnande läkemedel

Se Läkemedelskommitténs riktlinje (bilaga 2). Sammanfattning:

#### Rekommendation för vaccination med något vaccin mot COVID-19 om patienten har pågående behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare.

Vaccinet kan ges:

- Vid behandling med enbart ett "blodförtunnande läkemedel" (även warfarin om  $PK < 3,0^*$ )
- Vid kombination av två "blodförtunnande" läkemedel
  - a) warfarin (om  $PK < 3,0^*$ ) **eller** DOAK, **plus en** trombocythämmare
  - b) två olika trombocythämmare, t ex klopidogrel **plus** acetylsalicylsyra
- Vid "trippelbehandling" (warfarin eller DOAK, **plus två** olika trombocythämmare): Vänta helst med vaccination tills trippelbehandlingen upphör. Om det inte är möjligt, se till att PK-värdet är dagsaktuellt ( $PK < 1,8$ )! Ta gärna kontakt med AK-mottagning för hjälp med dosjustering.

För ALLA patienter med antikoagulantia-behandling: KOMPRIMERA i 10 minuter och låt patienten stanna kvar på lämplig plats. Observera stickstället före hemgång.

\* Kommentarer och observanda:

- a) Aktuellt PK-värde ska inte vara äldre än en vecka. Meddela AK-mottagningen om warfarin-dosen minskas inför vaccination!
- b) För DOAK och lågmolekylärt heparin: Om möjligt, ge vaccinet i slutet av ett intervall mellan två dostillfällen. Då är koncentrationen (och antikoagulationseffekten) som lägst ("dalvärde").

*Lisa Labbé Sandelin*

Lisa Labbé Sandelin  
Smittskyddsläkare

Basenhetschef

Medicinskt Ledningsansvarig läkare

### Bilagor

- Bilaga 1 Riktlinje Vaccination mot covid-19 inkl. Beredningsinstruktion  
Bilaga 2 Riktlinje för covid-19-vaccination vid antikoagulantia-behandling