

## Checklista för behandling med Prolia

Gäller för: Region Kalmar län

Ansvariga: Terapigrupp Osteoporos

Personnummer \_\_\_\_\_

Namn \_\_\_\_\_

Övrigt \_\_\_\_\_

Ordinationsdatum \_\_\_\_\_ Läkare \_\_\_\_\_

- Pågår eller planeras invasiv tandvård?      Ja      Nej
- Allergier?      Ja      Nej
- Kalk- och D-vitaminbehandling
- Provtagning 1–2 veckor före varje planerad behandling (S-kalcium jon och P-kreatinin med GFR).
- Normalt värde S-kalcium jon
- Provtagning även 2 veckor efter första behandling (S-kalcium jon och P-kreatinin) för att utesluta hypokalcemi.  
Risken för hypokalcemi är högre vid GFR <30 ml/min. Om GFR > 30 ml/min behövs ej uppföljande prov tas efter kommande Prolia-injektioner (observera att GFR < 30 ml/min inte utgör en kontraindikation för Prolia-injektion, men alltså kräver skärpt observans avseende hypokalcemi utveckling)
- Kallelse och patientinformation skickad till patienten
- Prolia injektionsvätska 60 mg rekvideras i beställningsmall för läkemedel (eller recept är utfärdat)
- Behandlingsdatum \_\_\_\_\_
- Patienten är utrustad med telefonnummer till sjuksköterska/mottagning
- Nästa behandling \_\_\_\_\_